

# 2

## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

### 2.1. Основы теории измерений. Данные для статистического анализа

Когда мы подходим к границам наших знаний, точность измерений оказывается фактором, ограничивающим дальнейшее их углубление. Долгое время атом считали не делимым, но повышение точности измерений позволило открыть много нового в ядерной физике, например, сравнительно недавно было доказано, что и электрон тоже не является цельной, неделимой частицей. В то же время требования к точности измерений являются необходимым условием не только для развития наших знаний о мире, но и для осуществления народно-хозяйственной деятельности.

Современная теория измерений опирается на физику измерительных процессов, метрологию, математическую статистику и теорию вероятности. Например, одной из функций метрологии - создание и развитие теоретических основ измерений: разработка теории измерений и методов оценки погрешностей.

Состояние современной измерительной техники, теории измерений и методик обработки результатов позволяют добиваться очень большой точности результата и выражения этого результата с помощью математических моделей.

Нельзя недооценивать роль измерений в научных исследованиях и в процессах контроля параметров процессов для управления последними.

Как правило, измерительная информация является основой для изучения объектов окружающего мира, в том числе и искусственных объектов созданных человеком. К таким объектам можно отнести производимую продукцию и технологические процессы её производства. Для оценки состояния качества продукции и управления процессами производства крайне важно и необходимо знать с заранее определенной точностью сведения об объектах и их свойствах.

Все объекты окружающего мира характеризуются своими свойствами. Свойство – философская категория, выражающая такую сторону объекта (явления, процесса), которая обуславливает его различие и общность

с другими объектами (явлениями, процессами) и обнаруживается в его отношениях к ним. Свойство – категория качественная. Для количественного описания различных свойств процессов и физических тел вводится понятие величины.

Величина – это свойство чего-либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и количественно. Величина не существует сама по себе, она имеет место лишь постольку, поскольку существует объект со свойствами, выраженными данной величиной.

Измерением называют совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины и позволяющего сопоставить с ней измеряемую величину. Полученное значение величины и есть результат измерений.

Измерения связаны как с физическими величинами, так и с величинами, относящимися к другим наукам.

Физической величиной называют одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением.

Средство измерения (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени (рис. 2.1).

Средство измерений позволяет воспринять, преобразовать, при необходимости сопоставить с мерой и представить значение измеряемой физической величины.




Рис. 2.1. Классификация средств измерений

Разработка средств измерений является задачей приборостроения, метрология же должна дать единую классификационную схему средств измерений и выявить совокупность их параметров, стандартизация кото-

рых позволила бы выбрать средства, обеспечивающие получение результата с заданной точностью, прогнозировать точность проводимых с помощью этих средств измерений и установить методы их проверки.

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их точности.

Остановимся на классификации величин (рис. 2.2).




Рис. 2.2. Классификация величин

Величины можно разделить на два вида: реальные и идеальные. Идеальные величины главным образом относятся к математике и являются обобщением (моделью) конкретных реальных понятий.

Реальные величины делятся, в свою очередь, на физические и нефизические.

Физическая величина (ФВ) в общем случае может быть определена как величина, свойственная материальным объектам (процессам, явлениям), изучаемым в естественных (физика, химия) и технических науках. К нефизическим следует отнести величины, присущие общественным (нефизическим наукам) – философии, социологии, экономике и т.д.

Одно из определений физической величины. Физической величиной – одно из свойств физического объекта, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а количественном – индивидуальное для каждого из них. Таким образом, физические величины – это измеренные свойства физических объектов и процессов, с помощью которых они могут быть изучены.

Физические величины целесообразно разделить на измеряемые и оцениваемые. Измеряемые физические величины могут быть выражены количественно в виде определённого числа установленных единиц измерения. Возможность их введения и использования является важным от-

личительным признаком измеряемых ФВ. Физические величины, для которых, по тем или иным причинам, не может быть введена единица измерения, могут быть только оценены.

Нефизические величины, для которых единица измерения в принципе не может быть введена, могут быть только оценены.

## 2.2. Случайные величины

Всякая случайная величина  $X$  обладает тем свойством, что при производстве в неизменных условиях  $n$  наблюдений будут зарегистрированы неодинаковые значения  $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n$ , среди которых, однако, могут встречаться и повторяющиеся. Различают *дискретные* и *непрерывные* случайные величины.

**Дискретная случайная величина** принимает лишь отдельные, изолированные одно от другого значения. Таким свойством обладают, прежде всего, параметры, называемые атрибутивными признаками (например – цвет предмета, сорт продукции, годное или бракованное изделие и т. д.). Отдельные значения подобных параметров определяются путем счета и поэтому значениями дискретной случайной величины могут быть только натуральные числа.

**Непрерывная случайная величина** принимает любые значения из некоторого свойственного ей числового интервала. Таким свойством обладают количественные признаки (механические свойства материала, фактические размеры продукции, производительность агрегата при обработке конкретного профилеразмера и т. п.) Отдельные значения таких параметров определяются путем измерений или расчетов и поэтому могут быть любыми действительными числами.

Нужно понимать, что работая с реальными процессами производства, человек сталкивается преимущественно с непрерывными величинами, которые могут характеризовать свойства продукции или параметры процессов. Однако для управления процессами с использованием автоматизированных систем стоит уделять отдельное внимание величинам дискретного характера, так как их применение в вопросах кибернетики очень обширно.

И для дискретной, и для непрерывной случайной величины характерны, по крайней мере, две закономерности:

1. Всякая случайная величина имеет некоторый ограниченный с обеих сторон интервал варьирования, величина и положение которого на числовой оси обусловлены ее физической природой. Случайность проявляется лишь в том, что значение, которое будет обнаружено в некоторый момент наблюдения за анализируемым пара-

метром, заранее не известно.

2. Каждое значение случайной величины проявляется внутри интервала ее варьирования с совершенно определенной вероятностью.

### 2.3. Закон распределения

Закон распределения – соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями. Часто также используют термин «Распределение вероятности». Закон распределения представляют либо функцией распределения, либо плотностью распределения.

Существует множество законов распределения и областей и применения. Нужно понимать, что при подтверждении гипотезы определенного закона распределения случайной или дискретной величины исследователь получает возможность применять весь инструментарий математической статистики, который характерен данному закону распределения.

Нормальный закон распределения широко применяется в задачах практики. Объяснить причины этого впервые удалось Ляпунову. Он показал, что если случайная величина может рассматриваться как сумма большого числа малых слагаемых, то при достаточно общих условиях закон распределения этой случайной величины близок к нормальному независимо от того, каковы законы распределения отдельных слагаемых. А так как практически случайные величины в большинстве случаев бывают результатом действия множества причин, то нормальный закон оказывается наиболее распространённым законом распределения.

Логарифмически нормальное распределение встречается в ряде технических задач. Используется при рассмотрении размеров частиц при дроблении, содержаний элементов в минералах в изверженных горных породах, численности рыб в море и т.д. Встречается такое распределение во всех задачах, где логарифм рассматриваемой величины можно представить в виде суммы большого количества независимых равномерно малых величин.

Экспоненциальное распределение часто встречается в теории массового обслуживания (например,  $X$  — время ожидания при техническом обслуживании или  $X$  — продолжительность телефонных разговоров, ежедневно регистрируемых на телефонной станции) и теории надёжности (например,  $X$  — срок службы радиоэлектронной аппаратуры).

Распределение Вейбула в ряде случаев характеризует срок службы радиоэлектронной аппаратуры и, кроме того, применяется для аппроксимации различных несимметричных распределений в математической статистике.

Все возможные значения равномерно распределённой случайной величины лежат в пределах некоторого интервала; кроме того, в пределах этого интервала все значения случайной величины одинаково вероятны (обладают одной и той же плотностью вероятности). Равномерно распределение реализуется в экспериментах, где наудачу ставится точка на отрезке  $[a;b]$  ( $X$  - абсцисса поставленной точки). Равномерно распределённая случайная величина встречается также в измерительной практике при округлении отчётов измерительных приборов до целых делений шкал. Ошибка при округлении отчёте до ближайшего целого деления является случайной величиной  $X$ , которая может принимать с постоянной плотностью вероятности любое значение между двумя соседними целыми делениями. Самая широкая область применения это использование распределения как теоретической основы для вычисления неопределенности второго рода в современной метрологии и теории измерений.

Существуют и другие распределения (например, Стьюдента, Фишера Хи-квадрат и т.д.) применяемые для разных задач статистического оценивания.

**Функция распределения** отображает вероятность события, заключающегося в том, что случайная величина (например  $X$ ) примет значение меньше, чем произвольное действительное число  $x$  (т. е. вероятность события  $X < x$ ):

$$F(x) = P(X < x). \quad (2.1)$$

В виде функции распределения можно отобразить закон распределения как непрерывной, так и дискретной случайной величины (рис. 2.3).




Рис. 2.3. Функции распределения непрерывной (а) и дискретной (б) случайных величин

Независимо от вида случайной величины функция распределения обладает следующими свойствами:

1.  $F(x)$  есть неубывающая функция  $x$  и если  $x_1 < x_2$ , то  $F(x_1) < F(x_2)$ . Разность двух ординат, соответствующих точкам  $x_1$  и  $x_2$ , дает вероятность того, что значения случайной величины будут лежать в интервале между  $x_1$  и  $x_2$ :

$$P(x_1 < X < x_2) = F(x_2) - F(x_1). \quad (2.2)$$

2. Значения функции распределения при предельных значениях аргумента (т. е. соответствующей случайной величины) равны 0 и 1. Для генеральной совокупности это свойство записывают следующим образом:

$$F(x_{min}) = 0, F(x_{max}) = 1. \quad (2.3)$$

Функция распределения дискретной случайной величины является разрывной ступенчатой, скачки которой происходят в точках, соответствующих возможным значениям случайной величины, и равны вероятностям этих значений (рис. 2.3,б).

**Плотность распределения** (встречаются термины: *плотность распределения вероятности*, *плотность вероятности*) отображает вероятность события, состоящего в том, что произвольное значение  $x$  случайной величины  $X$  находится в некотором наперед заданном интервале  $\{x_1, x_2\}$  (т. е. вероятность события  $x_1 < x < x_2$ ):

$$f(x) = P(x_1 < X < x_2). \quad (2.4)$$

График плотности распределения случайной величины на рис. 2.4.




Рис. 2.4. Плотность распределения вероятности случайной величины

Плотность распределения существует только для непрерывной случайной величины и если функция распределения данной случайной величины непрерывна и дифференцируема, то:

$$f(x) = F'(x). \quad (2.5)$$

По сравнению с функцией распределения описание распределения с помощью плотности вероятности более удобно и наглядно, так как позволяет отобразить его особенности на различных участках внутри интервала варьирования данной случайной величины.

Свойства плотности распределения:

Плотность распределения определяет случайную величину также полно, как и функция распределения и является неотрицательной функцией:

$$f(x) \geq 0. \quad (2.6)$$

Площадь, ограниченная числовой осью, кривой плотности распределения, а также прямыми  $x = x_1$  и  $x = x_2$  равна вероятности того, что случайная величина примет некоторое значение в рассматриваемом интервале:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = P(x_1 < x < x_2). \quad (2.7)$$

Так как событие  $x_{min} < x < x_{max}$  является достоверным, площадь под кривой плотности распределения равна 1:

$$\int_{x_{min}}^{x_{max}} f(x) dx = 1. \quad (2.8)$$

## 2.4. Нормальное распределение и его особенности

К настоящему времени обнаружен целый ряд законов распределения вероятности. Для дискретных случайных величин наиболее характерны распределение Пуассона и биномиальное. Для непрерывных случайных величин известны показательный и нормальный законы распределения, а также связанные с нормальным, - распределения Стьюдента, Фишера и хи-квадрат.

Нормальное распределение занимает особое положение, так как в соответствии с *центральной предельной теоремой* теории вероятности оно является предельным законом, к которому, при весьма часто встречающихся условиях, приближаются все другие распределения.



*Нормальное распределение* - это распределение *непрерывной* случайной величины, для которого характерна плотность распределения вида:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[ -\frac{(x - M_x)^2}{2\sigma^2} \right], \quad (2.9)$$

где  $M_x$  – математическое ожидание (характеристика положения истинного значения случайной величины);

$\sigma$  - стандартное отклонение (характеристика вариации значений случайной величины).

Функция и плотность нормального распределения схематично изображены на рис. 2.5.




Рис. 2.5. Функция и плотность нормального распределения

Нормальное распределение имеет следующие важные для практического использования свойства:

1. Кривая плотности распределения симметрична относительно прямой  $x = M_x$  и при этой абсциссе достигает максимума, который равен

$$f_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \frac{0,3989}{\sigma}. \quad (2.10)$$

2. Площадь под кривой, ограниченная ординатами  $f(M_x - 3\sigma)$  и  $f(M_x + 3\sigma)$  равна 0,9973 (т. е. практически 1). Это означает, что при нормальном распределении случайной величины вероятность проявления ее значений, отличающихся от математического ожидания более, чем на  $3\sigma$ , практически равна нулю.
3. Площадь под кривой, ограниченная ординатами  $f(M_x - 2\sigma)$  и  $f(M_x + 2\sigma)$  равна 0,9544 (с достаточной для практики точностью 0,95). Это означает, что при нормальном распределении случайной величины вероятность проявления ее значений, отличающихся от математического ожидания более, чем на  $2\sigma$ , не превышает 0,05 (т. е. 5 %).
4. Площадь под кривой, ограниченная ординатами  $f(M_x - \sigma)$  и  $f(M_x + \sigma)$  равна 0,6826 (для практических целей можно принять 0,7). Это означает, что при нормальном распределении случайной величины вероятность проявления ее значений, отличающихся от математического ожидания более, чем на  $\sigma$ , равна 0,3 (т. е. 30 %).
5. Нормальное распределение обладает свойством линейности, которое формулируется так. Если *независимые* случайные величины  $X_1$  и  $X_2$  имеют нормальные распределения, то для произвольных чисел  $\alpha$  и  $\beta$  величина  $Y = \alpha X_1 + \beta X_2$  также имеет нормальное распределение, причем из свойств математического ожидания и дисперсии следует:

$$M_Y = \alpha M_{X_1} + \beta M_{X_2}; \quad (2.11)$$

$$\sigma_Y = \sqrt{\alpha^2 \sigma_{X_1}^2 + \beta^2 \sigma_{X_2}^2}. \quad (2.12)$$

## 2.5. Стандартное нормальное распределение и функция Лапласа

Нормальное распределение зависит от двух параметров - математического ожидания  $M_x$  и стандартного отклонения  $\sigma$ , что затрудняет ее представление в табличном (табулированном) виде. Поэтому было предложено использовать нормированную случайную величину:

$$Z = \frac{x - M_x}{\sigma},$$

для которой функция плотности нормального распределения (2.9) принимает вид:

$$f(x) = \varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right). \quad (2.13)$$

График плотности стандартного нормального распределения приведены на рис. 2.6.




Рис. 2.6. Стандартное нормальное распределение:  
 $\varphi(z)$  – кривая Гаусса;  $\Phi(z)$  – Функция Лапласа

График плотности стандартного нормального распределения называют “кривая вероятностей”, “кривая Гаусса”. Основным отличием кривой Гаусса от кривой ненормированного нормального распределения яв-

ляется то, что она фактически строится для  $M(x) = 0$  и  $\sigma = 1$  (рис. 2.6). Из указанной особенности следует ряд специфических свойств.

1. Плотность стандартного нормального распределения симметрична относительно оси ординат и имеет максимум, равный 0,3989.
2. Плотность стандартного нормального распределения является четной функцией:

$$\varphi(-z) = \varphi(z).$$

3. При  $z = 4$  плотность стандартного нормального распределения равна нулю

$$\varphi(4) = 0,0001 \approx 0.$$

Поэтому при ее табулировании указываются значения для нормированных значений случайной величины от 0 до 4.

4. Значение функции ненормированного нормального распределения равно значению функции стандартного нормального распределения.

Чтобы получить функцию стандартного нормального распределения необходимо выполнить интегрирование зависимости (2.13), однако результат не может быть выражен через элементарные функции. Поэтому используется функция Лапласа:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{u^2}{2}} du. \quad (2.14)$$

Смысл функции Лапласа иллюстрируется рис.2.7 -  $\Phi(z)$  представляет собой значение вероятности, с которой случайная величина, обладающая стандартным нормальным распределением, принимает значение из интервала  $\{0; z\}$ .




Рис.2.7. К определению Функции Лапласа

Основные свойства функции Лапласа:

1. Функция Лапласа является нечетной:

$$\Phi(-z) = -\Phi(z).$$

Ее график симметричен относительно начала координат (рис. 2.7) и  $\Phi(0)=0$ .

2. Функция Лапласа является монотонно возрастающей в пределах от  $\Phi(-4) = -0,5$  до  $\Phi(+4) = +0,5$ .

С учетом указанных свойств переход от функции Лапласа к функции стандартного нормального распределения осуществляется следующим образом:

$$F(z, 0, 1) = 0,5 + \Phi(z).$$

## 2.6. Выборка и выборочные характеристики

Как уже отмечалось, случайная величина может принимать множество значений, которые, однако, соответствуют объективно существующему интервалу ее варьирования. Совокупность всех возможных значений случайной величины  $\{\chi_j\}_N$  для всех возможных условий наблюдений называется генеральной совокупностью. Количество значений случайной величины в генеральной совокупности (объем генеральной совокупности)  $N$  определяется характером случайной величины и для непрерывной величины  $N \rightarrow \infty$ .

По некоторым причинам, например в связи с ограниченностью продолжительности наблюдений, из генеральной совокупности удастся обнаружить лишь  $n < N$  значений случайной величины  $\{x_i\}_n$ . Совокупность ограниченного числа значений случайной величины, которые получены в результате наблюдения, называют выборкой, а количество  $n$  значений в выборке - объемом выборки. Выборка является подмножеством генеральной совокупности:

$$\{x_i\}_n \in \{\chi_j\}_N.$$

Для решения прикладных задач разработаны и применяются специальные числовые характеристики распределения вероятности. Каждая такая характеристика имеет строго определенный смысл, который не изменяется от того, что рассматривает исследователь - генеральную совокупность или выборку из нее. Однако формулы для расчета числовых характеристик распределения в каждом из указанных случаев могут быть различными.

При использовании числовых характеристик случайной величины весьма важным является следующее обстоятельство. Изучая случайную величину, мы не можем охватить генеральную совокупность и поэтому, имеем в своем распоряжении лишь ограниченную выборку из нее. Таким образом, по выборке будут получены не истинные значения той или иной характеристики распределения изучаемой случайной величины, а лишь их приближенные значения (оценки).

В общем случае для оценивания некоторого параметра  $\xi$  генеральной совокупности используется некоторая величина  $\theta$ , вычисляемая по результатам выборки. По смыслу  $\xi$  и  $\theta$  характеризуют одно и то же свойство случайной величины. Однако величина  $\theta$  является *выборочной оценкой* действительного значения анализируемого параметра:  $\theta \approx \xi$ , в литературе ее часто называют *статистикой*. Статистика есть случайная величина, распределение которой отличается и от распределения случайной величины в генеральной совокупности, и от распределения оцениваемого параметра  $\xi$ . В связи с этим выборочные оценки должны отвечать ряду требований.

1. Выборочная оценка должна быть **состоятельной**. Оценка  $\theta$  является состоятельной, если с увеличением объема выборки  $n$  вероятность ее значения стремится к вероятности значения оцениваемого параметра генеральной совокупности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Pr ob \{ |\theta - \xi| < \Delta \} = 1 \text{ или } \theta \xrightarrow{Pr ob} \xi.$$

2. Выборочная оценка должна быть **несмещенной**. Оценка  $\theta$  является несмещенной, если при любом объеме выборки ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру:

$$M_{\theta} = \xi.$$

3. Выборочная оценка должна быть **эффективной**. Из различных оценок одного и того же параметра генеральной совокупности наиболее эффективной является та, которая обладает наименьшей дисперсией:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D_{\theta} = 0.$$

## 2.7. Контрольные вопросы

1. Как классифицируют параметры объекта исследования с позиций обработки и анализа числовой информации? Каков характер параметров объекта исследования?
2. Перечислите и кратко поясните наиболее распространенные задачи, решаемые обработкой и анализом числовой информации.
3. Назовите виды и закономерности случайной величины.
4. Функция и плотность распределения вероятности.
5. Нормальное распределение вероятности и его особенности.
6. Стандартное нормальное распределение вероятности и его особенности.
7. Функция Лапласа.
8. Генеральная совокупность и выборка.
9. Понятие о выборочных оценках характеристик случайной величины и требования к ним.